

1 每天清潔公用設施，為訪客進行體溫監測

- 保持空氣流通。
- 先為訪客量度體溫，並拒絕發燒者或有呼吸道感染病徵的人士到訪。
- 提供潔手設施(如含有70-80%酒精的搓手液)於接待處等公共地方。

每天最少兩次清洗及拭抹公用設施如坐椅、休憩地方、信箱等。

定期清潔升降機內的抽氣扇，並保持其性能良好。

於大堂門口放置噴有1比49稀釋家用漂白水的消毒地毯，並視乎人流定期加噴，減少細菌經鞋底傳播。

不建議向場所環境表面和個人噴灑消毒液，因為會危害健康，而且不會降低病毒傳播。物件的表面應該用浸過消毒液的抹布或濕巾擦拭。

- 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、共用物品和地板：
- 使用1比99稀釋家用漂白水消毒。
 - 待15 - 30分鐘後，用水清洗並抹乾。
 - 金屬表面則可用70%酒精消毒。

每天最少兩次清潔及拭抹公眾經常接觸到的地方，例如大堂入口範圍(門柄/拉手、密碼開關按鈕等)、升降機和扶手電梯(尤其是按鈕及扶手位置)等，並應按人流增加清潔頻率。



2 垃圾房範圍及設施

每天清洗垃圾房範圍及設施最少兩次，妥善清理垃圾及廢物。



3 公用廁所

保持公用廁所清潔和乾爽，定時加添視液及抹手紙，確保洗手設施及沖廁系統等操作正常。



觸摸眼睛、鼻或口前、進食前、如廁後要清潔雙手。
洗手時應加入視液，搓手最少20秒後再沖水，其後用抹手紙弄乾。

最少每星期一次把約半公升的清水注入排水口(U型隔氣口)，並須定期檢查排水渠管，如有損毀，或發出臭氣，應立即安排合資格技工檢查及維修。

4 當有懷疑 / 確診2019冠狀病毒病感染的個案時

用1比49稀釋家用漂白水加強消毒所有可能被污染的環境表面及用品。

清理血液、分泌物、嘔吐物或排泄物等污染物時，應加強措施：

- 先用鉗夾住吸水力強的即棄抹布抹去可見污染物；
- 棄置用後鉗子及即棄抹布於廢物袋內；
- 使用1:4稀釋家用漂白水消毒，由外而內抹拭，待10分鐘後，再用清水清洗，然後抹乾；
- 完成程序後，將所有廢物和清潔用具(如鉗子、抹布、拖把頭)棄置於廢物袋內；
- 除下個人防護裝備並將之棄置於廢物袋內，隨即潔手；
- 佩戴新手套，妥善包裝廢物袋及正確棄置於有蓋垃圾桶內。將垃圾桶貼上標記和放在不受打擾的安全地方等待收取；
- 除下手套，以視液和清水徹底潔手；
- 一旦確認為2019冠狀病毒病時，衛生防護中心會通知食物環境衛生署消毒受污染的環境並棄置廢物。



負責清潔員工應穿上適當個人防護裝備，包括：外科口罩、膠手套、即棄保護衣、眼部防護裝備(護眼罩/面罩)及保護帽。穿戴次序、步驟、方法可參考本局前線員工抗疫手冊(網址：<https://bit.ly/32LnnFJ>)。

